

GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM

Compte rendu de la séance du 21/05/15

Identifiant du groupe : 78110LEV001

Secrétaire : Dr TRAN

Modérateur : Dr VERNIER

VOTE DPC : 2015-16

Arrêt maladie, accident travail , maladie professionnelle : prescrire, rédiger, accompagner (penser à s'inscrire rapidement pour la formation sur le site mondpc et sur SFMG !!)

Temps 1 exemples :

•Problèmes soulevés par le groupe

- Dossier 1 : femme 68 ans, rhinopharyngite chez patiente nosophobe : comment ne pas passer à côté d'une pathologie sévère chez une patiente nosophobe ?
- Dossier 2 : femme 77 ans RO HTA sous Iperten Bisoprolol clairance = 50, OMI : arrêt Iperten pour HCTZ 6.25 : a-t-elle eu un doppler des artères rénales ? rechercher une sténose AR devant HTA résistante avec tt bien pris ? stratégie thérapeutique devant HTA ? CAT devant HTA résistante ?
- Dossier 3 : femme 17 ans : asthénie, oppression, prise poids, anxiété : troubles anxieux mineurs : Passiflor : consultation seule avec une patiente mineure ? Mais qu'elle est l'âge de la majorité ? prises de MD, cannabis ? cocaïne ? CAT devant un mineur consommateur de drogues ?
- Dossier 4 : fille 5 ans, angine érythémato pultacée tt par Amox : indications des TDR ? spécificité ? sensibilité ?
- Dossier 5 : 37 ans homme : lombalgie commune aigue en cours d'amélioration à J15 : pas de question
<https://kce.fgov.be/fr/publication/report/lombalgie-chronique#.VV47xlXtmko>
- Dossier 6 : 76ans femme , tentative sevrage Bzd : Prescrire (diminuer1/4 cp), HAS (diminuer 25% par pallier) : sevrage des BZD chez personnes âgées
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_601509/fr/modalites-d-arret-des-benzodiazepines-et-medicaments-apparentes-chez-le-patient-age
- Dossier 7 : 38 ans femme, suivi arrêt travail pour épuisement professionnel , sous

seresta , INRS facteurs risques : charges de travail , faible équité : maladie professionnelle ? quand déclarer ? MOTS association (0608282589) pour répondre aux questions sur « burn out » , secrets professionnels entre soignants « dans l'intérêt du patient mais après avoir demandé l'accord du patient »

- Dossier 8 : 89 ans femme , pneumopathie d'allure atypique sous josacine , RT de contrôle après tt = ras , reprise fébrile un mois après , nouvelle RT= absence foyer systématisé , 2° prescription josacine = prurit généralisé ,replacée par augmentin = prurit généralisé , scanner = ras , prescription atrovent , mais devant persistance toux , expectoration AEG , ceftriaxone = amélioration en 3 jours , intérêt de la ceftriaxone dans les pneumopathie atypiques ? Diagnostic pneumopathie atypique avec scanner thoracique normal ?

Question pour « mois » prochain (plutôt en octobre prochain si mes calculs sont exacts , on a 3 séances de DPC) : signes devant faire aborder une toxicomanie chez l'adolescent

- **Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe**

Etude SOCKS : contention après TVP, pas de différence dans les groupes avec ou sans bas de contention : mais la conclusion de l'étude est qu'en fait les patients ne les mettent pas !

- **Ecart / à la pratique recommandée par l'HAS ...**

Temps 2

- **Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des soins**

Doppler artères rénales : Dr Cortier CHP Europe / Dr Casaban H St Ger : les patients doivent être à jeun

Service maladie professionnelle H Garches Dr D'Escatha & Dr D'Apotilo 0147107752/53: pour aider à statuer, accompagner une reconversion

Permanence téléphonique questions ABT Hopital St Ger Service infectieux : Dr Leclerc / Brazille

Temps 3

www.amicalecaneum.fr

•synthèse des cas compliqués :

•autres...

Réponses à la question posée lors de la séance précédente :

Quels sont les patients concernés par le score de CHADS ?

site cardiologie francophone

<http://www.cardiologie-francophone.com/PDF/scores/score-CHADS.pdf>

Critères validité CHADS2VASC ?

www.mdcalc.com/cha2ds2-vasc-score-for-atrial-fibrillation-stroke-risk

CHADS 2 VASC :

sexe

Homme=0

Femme=1

âge

< 65 ans = 0

65-75=1

>75 = 2

Pathologies associées

HTA=1

Insuffisance cardiaque =1

Diabète=1

Artériosclérose (IDM, artérite membres inférieurs, artériosclérose aorte)= 1

AVC, AIT = 2

Décisions mise en route traitement en fonction du score CHADS 2 VASC :

>2 = Warfarine

0 = rien

1= ? avis différent selon les différentes sociétés de cardio , Prescrire

2° question : bilan devant une urétrite

Prélèvement par écouvillonnage pour recherche gonocoque et trichomonas

PCR 1er jet pour chlamydiae + éventuellement gonocoque si le prélèvement par écouvillonnage ne retrouve pas de gonocoque