

## GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM

**Compte rendu de la séance du 16/01/14**

**Identifiant du groupe : 78110LEV001**

**Secrétaire : Dr TRAN**

**Modérateur : Dr PIRIOU**

### **Temps 1 exemples :**

- **Problèmes soulevés par le groupe**

- Dossier 1 : Gonalgie G homme 45 ans, recos HAS2010 prise en charge d'une lésion méniscale non traumatique : histoire naturel et traitements des lésions méniscales dégénératives ?
- Dossier 2 : Femme 30 ans Céphalées unilatérales (nausée photophobie) depuis 2 semaines sans antécédent de céphalée : IRM ou scanner en urgence oui mais pour chercher quoi ?
- Dossier 3 : Femme 42 ans : fracture métatarsienne, sinusite dentaire, fausse couche spontanée : algodystrophie dans les suites de la fracture : Prescrire n°306 = aucun signe spécifique clinique ou d'imagerie = c'est souvent le décalage entre les signes cliniques et les signe fonctionnels qui fait suspecter le diagnostic : tt efficaces : (fosamax 40mg / jour pendant 8 semaines) et neurontin 800 et kiné
- Dossier 4 : Homme 60 ans : récurrence orchi-épididymite traité 10 jours auparavant , ofloxacine 200x2 pendant 14 jours ( si risque MST : Rocephine + DOXY 10 j ) + naproxene + ECBU + echo : revoir le patient un mois après pour s'assurer que le testicule ne présente pas de tumeur : est ce que la fièvre obligatoire dans l'orchi épididymite ? NON, durée des ATB dans orchi épididymite ? Pour recherche des germes MST dans ECBU demander PCR Chlamydiae
- Dossier 5 : Femme 40 ans, Thyroidite Hashimoto hypothyroïdie séquellaire, palpitations : CAT ?
- Dossier 6 : Femme 35 ans, diarrhée, arrêt travail
- Dossier 7 : Femme 34 ans, gastro n° 2, vogalene, Acide Folique car désir grossesse ?
- Dossier 8 : Garçon 14 ans, douleur abdominale aigue diarrhée, trimebutine
- Dossier 9 : homme 75 ans, RO, AVC ischémique à 70 ans, simvastatine, Kardegic Xatral, ercefuryl imodium (voyage), mais suivi urologique + PSA réguliers : difficulté pour revenir sur prescription de spécialiste non en adéquation avec les données de la science
- Dossier 10 : garçon 10 ans, « splénomégalie sur échographie », le diagnostic est avant tout clinique, quand faire une échographie abdominale chez l'enfant ?

**Question pour mois prochain : histoire naturelle d'un ménisque dégénératif ?**

**Séance de mars : dépistage et comment déclarer la maltraitance des enfants**

- **Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe**

Les critères d'Ottawa sont applicables aux enfants de plus de 3 ans : étude canadienne sur Médecine

- **Ecart / à la pratique recommandée par l'HAS ...**

## **Temps 2**

- **Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des soins**

Dr Doublé et Vigne à A Mignot en urologie

Dr Bronstein à Parly II secteur I

Dr Politi CCBB uro enfant

Dr Lugagne, Herve, Ghoneim, Yonneau au CMC Foch Suresnes

## **Temps 3**

- **synthèse des cas compliqués :**

- **compte rendu des thèmes abordés au cours de la séance précédente**

- **autres...**

## **Réponses à la question posée lors de la séance précédente :**

**Dosage Advil chez l'enfant, dans la pipette c'est 7.5 mg/kg soit 4 fois par jour si on veut 30 mg/kg/j , ou 22.5 mg/kg/j si 3 prises par jour**