

GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM

Compte rendu de la séance du 20/01/2022

Secrétaire : Dr LABORNE

Modérateur : Dr CADIOT

1 - DOSSIERS PRESENTES PAR LE GROUPE :

Dossier 1 : Enfant de 3 ans, visite de 3 ans.

Dossier 2 : Femme de 63 ans, athérome isolée fibroscopie : ulcération œsophagienne anneau de schatzki, HP (-), renouvellement traitement Losartan, Rosuvastatine, Kardegic, Esomeprazole 20 – Règles de traitement par Kardegic sur athérome carotidien asymptotique

Dossier 3 : Homme de 49 ans pour contrôle glycémique, schizophrène sous traitement, HBA1C à 5,2%. Traitement des antipsychotiques atypique majore le risque de diabète par prise de poids et syndrome métabolique

Dossier 4 : Femme de 80 ans, calcul enclavé de 6 mm, traitement expulsif à l'alpha bloquant ; douleurs rachidiennes traitées par Paracetamol à bonnes doses. Efficacité des alpha bloquant pour les lithiases de plus de 6 mm (cf annexe)

Dossier 5 : Homme de 55 ans, diabétique, athérome, HTA, AOMI sévère, double AAP pourquoi ?, anxiété et détresse psychologique, suicide de sa femme il y a 2 mois – dépression, pas de traitement donné

Dossier 6 : Femme de 98 ans, renouvellement de traitement HTA et cholestérolémie, Arrêt pravastatine – indication de la pravastatine en prévention primaire

Question(s) à traiter : Existe-t-il une indication d'AAP en prévention primaire ?

2 - REPONSES A LA QUESTION POSEE LORS DE LA SEANCE PRECEDENTE :

Valaciclovir : bénéfice risque dans le traitement du zona

Intérêt pour plus de 70 ans ou zona ophtalmique.

AMM : à partir de 50 ans

Réduit les douleurs post-zostériennes

3 - REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES APPORTEES PAR LE GROUPE :

HAS et antibiocliv

Traitement depuis 2021 de l'otite :

- 3 mois et 2 ans : amoxicilline 80 mg/kg/j en 2 prises pendant 10 jours

- Plus de 2 ans : amoxicilline 80mg/kg/j en 2 prises pendant 5 jours

Sinon Bactrim en 2 prises par jour pendant 5jours

Plus de ans, si otorrhée ou otite récidivante : amoxicilline 80mg/kg/j en 2 prises pendant 10 jours

Revue du Praticien : vaccin pour l'enfant drépanocytaire

Plavix plus IPP : majoration d'AVC

Dosage de CRP et pneumonie chez adulte : si CRP <20 pas de pneumonie

Pic touche sur le pied : comment grader les soins

Modalités d'arrêt ou poursuite des traitements anticoagulants pour les soins dentaires (cf annexe)

4 - ECARTS PAR RAPPORT A LA PRATIQUE RECOMMANDEE PAR HAS :

Découverte d'une ACFA chez une patiente de 80 ans asymptomatique : anticoagulant et ECG dès que possible

Ozempic chez une obèse non diabétique

5 - SYNTHESE DES AMELIORATIONS PROPOSEES DU PARCOURS ET DE LA COORDINATION DES SOINS :

Orthopédie val d'or – Dr Cournabeau

6 - SYNTHESE DES CAS COMPLIQUES :


Enfant de 28 mois, constipation persistante, échographie ras, ASP fécalome, gastroentérite (Movicol et Paraffine pendant 15 jours)

Patiente de 63 ans, diabétique refusant toutes injections d'insuline.

7 - AUTRES QUESTION ET ECHANGES - DISCUSSION LIBRE :

Cas clinique à préparer pour la prochaine séance le 17/02/2022 : 3eme du
18/01/2022


Annexe 14 : Algorithme systématique de prise en charge des patients sous antiplaquetaires (AAP) en chirurgie orale.



* Détermination du niveau de risque thrombotique site consultable : www.has-sante.fr ; « Recommandations : Antagregants-plaquetaires : prise en compte des risques thrombotiques et hémorragique pour les gestes percutanés chez le coronarien » (HAS novembre 2013).

** Monothérapie : poursuivre la prescription d'aspirine, délai d'interruption: clopidogrel : 5 jours, prasugrel : 7 jours, ticagrelor 3 à 5 jours

Annexe 16 : Algorithme systématique de prise en charge des patients sous anticoagulants oraux directs (AOD) en chirurgie orale.




* **Pas d'arrêt** : il importe de préciser l'âge, l'indication (schéma curatif ou prévention en chirurgie orthopédique), la dose, le nombre de prises par jour, l'heure de la dernière de prise, geste à réaliser dans la demi-journée qui précède la prochaine prise

** **Arrêt AOD** : arrêter l'AOD la veille et le jour de l'intervention (fenêtre thérapeutique de 48h).

*** **Arrêt AOD et relais par l'héparine** : arrêter l'AOD 5 jours avant l'intervention chirurgicale.

Annexe 15 : Algorithme systématique de prise en charge des patients sous antivitamine K (AVK) en chirurgie orale.




* Chez les patients porteurs de prothèses valvulaires, la pose d'implant, la chirurgie pré-implantaires et parodontale sont contre-indiqués.

** Détermination du niveau de risque thrombotique : site consultable : www.has-sante.fr « Recommandations : Prise en charge des surdosages en antivitamines K, des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques chez les patients traités par antivitamines K en ville et en milieu hospitalier » (GEHT, HAS avril 2008).

*** Arrêt AVK : arrêter l'AVK à 4 à 5 jours avant l'intervention, reprise de l'AVK le soir ou le lendemain de l'intervention, pratiquer un INR à 48h (HAS 2008)

**** Arrêt AVK et relais par héparine : à J-5 arrêt de l'AVK, à J-3 relais par HBPM (ou HNF) à dose curative, à J-1 dernière injection HBPM (ou HNF) à dose curative, à J-1 reprise AVK et héparine (à moduler en fonction du risque hémorragique), arrêt de l'héparine dès que l'INR cible est atteint.

Annexe 17 : Algorithme systématique de prise en charge des patients sous héparines en chirurgie orale.



* vérifier si pas d'autres risques et précautions

TABLEAU. CALENDRIER VACCINAL POUR LES ENFANTS DRÉPANOCYTAIRES. HORS RATTRAPAGE ET HORS VOYAGE
(SERVICE DE PMI DE PARIS, D'APRÈS MH ODIEVRE)

Vaccin	Nom commercial	> M1	M2	M3	M4	M5	M6	M9	M11	M12	M15	M18	M24	A6
BCG	SSI	X												
DTCaPHibHB	Infanrix hexa, Hexyon, Vaxelis		X		X				X					
DTCaP	Tetravac acellulaire													X
Pneumocoque	Prevenar 13		X	X	X				X					
	Pneumovax												X et 5 ans après	
Rougeole oreillons rubéole	Priorix, M.M.RvaxPro									X		X		
MenC	Neisvac					X								
MenACYW	Nimenrix									X		X		
	Nimenrix, Menveo													X puis tous les 5 ans
MenB	Bexsero			X		X					X			
Grippe saisonnière	Tétravalent selon AMM													

Dès la première saison hivernale, primovaccination en 2 doses à un mois d'intervalle jusqu'à 9 ans ; puis 1 dose de rappel annuel
A partir de 9 ans, 1 dose annuelle