

## GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM

**Compte rendu de la séance du 27/09/2012**

**Identifiant du groupe : 78110LEV001**

**Secrétaire : Dr LE GRIX DE LA SALLE**

**Modérateur : Dr BONFILS**

### **Temps 1 exemples :**

#### **•Problèmes soulevés par le groupe**

- Dossier 1 : garçon de 15 ans, certificat de sport, ECG tous les 3 ans puis tous les 5 ans à partir de 35 ans. (Société Européenne de cardiologie : recommandation pour les certificats de sport).
- Dossier 2 : homme de 32 ans, origine haïtienne, bilan sanguin systématique, prostatite traitée par Cefixime après échec d'Uniflox : intérêt du tubertest
- Dossier 3 : homme de 65 ans traité par AVK, hématome simple de la jambe post-traumatique – faut-il faire un INR ?
- Dossier 4 : œdème angioneurotique traité par Danatrol
- Dossier 5 : femme de 86 ans, rhinite depuis 3 jours avec fièvre

Question 1 : Indication, technique et interprétation du Tubertest

Question 2 : bilan chez un migrant adulte asymptomatique originaire d'un pays en voie de développement

#### **• Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe**

#### **•Ecart / à la pratique recommandée par l'HAS ...**

Prescription de Furandine en traitement continu pour cystite récidivante

### **Temps 2**

- **Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des soins**

**Ergothérapie** : consultation à domicile, Mme Vaquette, Vaucresson,  
06.60.98.22.95

### **Temps 3**

- **synthèse des cas compliqués :**

Prescription d'Hypnovel en ville pour SLA

- **compte rendu des thèmes abordés au cours de la séance précédente**
- autres...

### **Réponses aux questions posées lors de la séance précédente :**

#### 1 - Indication des corticoïdes inhalés dans les toux trainantes en dehors de l'asthme.

Consensus du groupe : aucune indication et aucun intérêt. Pas d'efficacité prouvée et pas d'amélioration supplémentaire dans une étude versus placebo

A noter dans les effets indésirables de ces médicaments la survenue possible d'une toux

#### 2 - Intérêt d'un traitement antidépresseur à vie

Cf HAS traitement pendant 2 mois

Venlafaxine et Sertraline plus de 2 ans