

GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM

Compte rendu de la séance du 25/03/2010

Secrétaire : Dr LABORNE

Modérateur : Dr MAURY

Temps 1 exemples :

•Problèmes soulevés par le groupe

- Dossier 1 : Enfant 3 ans ½, otalgie sub-fébrile, pas de problème
Primperan malgré absence de preuves d'efficacité
- Dossier 2 : sciatalgie atypique. Problème soulevé : intérêt non prouvé d'une association IPP/AINS ; discordance HAS/prescrire
- Dossier 3 : rachialgies diffuses depuis 3 mois chez un homme de 33 ans.
Problème : prise en charge de la dorsalgie bilan immédiat ?
- Dossier 4 : homme 40 ans, syndrome infectieux respiratoire. Problème : résister à la demande d'ATB
- Dossier 5 : femme de 52 ans, poly-symptomatologie thoracique et abdominale.
Problème : faut-il entretenir les patients dans leurs croyances ?

Question 1 : prise en charge de la dorsalgie aiguë non traumatique de l'adulte

Question 2 : stratégie face à une demande d'antibiotique

•Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe

•Ecart / à la pratique recommandée par l'HAS ...

Temps 2

•Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des soins

taxi conventionné : liste sur ameli.fr :

http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/20100112_taxis.pdf

taxi disponible ATY78 0130086060

Pr P Guigui, Hopital BEAUJON, service de chirurgie orthopédique et pathologie du rachis : 01.40.87.52.53

Temps 3

- synthèse des cas compliqués :
- compte rendu des thèmes abordés au cours de la séance précédente
- autres...

Synthèse des cas compliqués :

Endo-prothèse coronarienne : AAS +PLAVIX
1 an si stent actif
4 semaines si nu

prescrire2009/04 n°306

Problème de fièvre au long cours

Indications du BUD : pas d'intérêt en cas d'incontinence urinaire d'effort
Incontinence urinaire d'effort souvent associée à un prolapsus (Progrès en urologie 2009)

Réponses aux questions posées lors de la séance précédente :

1 - Vaccination par REPEVAX chez la femme enceinte

HAS : non

CRAT : pas de contre indication, pas de recommandation non plus

Recommandé pendant allaitement

2- coloscopie : jusqu'à quel âge ?

Pas d'âge limite

Choix du cas clinique pour la prochaine fois : 4ème du 8 avril 2010